



Diagnose: voorste kruisband laesie

Een voorste kruisband laesie (VKL), is een knieprobleem dat kan bestaan uit een geheel of gedeeltelijk gescheurde voorste kruisband. Een VKL gaat soms gepaard met een kapotte meniscus, deze kapotte meniscus ontstaat door vooral met pijnstilling meer dan één maand door te lopen met een 100% kapotte voorste kruisband.

Tip: Voorkom het beschadigen van de meniscus door een hond met een versleten linker knie aan uw rechterhand aangeliend uit te laten en alle bochten, wanneer mogelijk, rechts te nemen. Uiteraard kunt u het proces omdraaien bij een versleten rechter knie. Houd in beide gevallen de dosering van de pijnstilling zo laag mogelijk.

Wat is de oorzaak van een VKL:

Een voorste kruisband laesie is gedeeltelijk genetisch bepaald en ontstaat door met een stilstaande voet een plotselinge draai te maken, wat nog versterkt kan worden door gelijktijdig de knie te overstrekken. Dit kan bijvoorbeeld door naar een bal te springen of door in een kuil te stappen.

Behandeling/ operatie:


De knie van uw hond wordt operatief behandeld. Hierbij wordt een snede gemaakt over de knie of aan de binnenkant van de knie. De knie wordt van binnenuit schoongemaakt en restanten van de voorste kruisband worden samen met de losse randjes van de kapotte meniscus verwijderd.

Daarna wordt er een nieuwe onoplosbare, soms dubbele, kunstband aangebracht. Vervolgens wordt het gewrichtskapsel, wat alles op zijn plek houdt, dubbel gehecht en ingekort waardoor extra stabiliteit ontstaat. Ten slotte wordt de huid onderhuids gehecht, hierdoor ziet u alleen nog de slothechtingen boven de huid uit steken.

Prognose:

Bij honden die niet maandenlang hebben doorgelopen met een VKL zijn de resultaten zeer gunstig, maar wat kan er fout gaan? Een klein deel van de patiënten “stoot” de kunstband(en) af. Dit is te herkennen aan een fistel of blaarvorming aan de binnenkant van de knie. Let op dat dit ook kan komen door een lichamelijke reactie op het hecht draad.

Ook kan de hond in een spagaat glijden. Om dat te voorkomen is het belangrijk dat de patiënt zich in de eerste week voortbeweegt op enkel een ruwe ondergrond en niet op een gladde vloer.



De operatie duurt ongeveer anderhalf uur. Na de ingreep wordt u door de dierenarts op de hoogte gebracht. Vervolgens zal de patiënt de narcose uitslapen in de opname. Wanneer uw hond wakker genoeg is, zal de opname-assistent met u contact opnemen en een afspraak maken om de patiënt op te halen. Meestal gebeurt dit rond 16:45 h. De dierenarts zal u dan persoonlijk te woord staan.

De operatiedag:

Na operatie zal uw hond niet altijd zin hebben om te lopen. Vaak gebeurt dat dan ook nog op 3 poten. U mag een klein stukje lopen om uw hond te laten ontlasten en plassen. Daarna moet de patiënt direct terug naar binnen. Traplopen, op de bank springen en andere activiteiten die de knie belasten, moeten zoveel mogelijk worden vermeden!

Indien uw hond morfine heeft gekregen na de operatie, kan dit thuis tot in de avond gepaard gaan met huilen / loeien. Dit is geen teken van pijn, maar eerder een soort afkickverschijnsel. Geef de eerste drie weken de volledige dosering pijnstilling.

De eerste week:

Na de operatiedag mag u uw hond meerdere malen per dag kleine afstanden uitlaten. Wanneer uw hond last krijgt bij het opstaan of de poot optrekt bij stilstand, moet u de afstand een aantal dagen verder beperken.

Drie tot vier dagen na de operatie wordt u terug verwacht bij de kliniek voor een wondcontrole en het verwijderen van het verband. Is er echter sprake van weefselzwellen boven het verband, neem dan ALTIJD contact op met de kliniek.

De tweede week:

Tien dagen na de operatie wordt u terug verwacht bij de kliniek voor het controleren van de wond en het verwijderen van de hechtingen.

De derde week:

Drie weken na de operatie komt u samen met uw hond naar de kliniek voor een controle afspraak bij de dierenarts. Tijdens dit gesprek krijgt u de fysio oefeningen uitgelegd die u later moet gaan toepassen bij uw hond.

Drie weken lang heeft u de volledige dosering pijnstilling gegeven. Vanaf week drie wordt de dosering gehalveerd. Hier gaat u mee door gedurende twee tot vier weken, afhankelijk van de toestand van de knie en de mening van de arts.

De tweede maand:

Twee maanden na de operatie mag uw hond, na eerste 30 tot 45 minuten aangelijnd te hebben gewandeld, even losgelaten worden. De duur van het loslaten mag u daarna iedere dag iets verlengen.

Na week drie wordt de pijnstilling geminderd. Uiterlijk halverwege de tweede maand na de operatie, wordt de medicatie voor de laatste keer afgebouwd. Een goed voorbeeld hiervan is om de dag een halve dosering pijnstilling.



Het herstel van deze ingreep zal zeker 2-3 maanden in beslag nemen

Bij spoed:

- Wanneer uw hond na een actie kreupel loopt of bij stilstand de poot optilt; probeer eerst de knie te koelen. Wikkel een coldpack in een theedoek en leg deze telkens drie minuten op de knie met daarna één minuut tussentijd. Dit kan tot maximaal één uur. Geef daarna gedurende minimaal één week de volle dosering pijnstilling.

Mocht u twifelen aan het herstel van uw huisdier na de operatie, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Wij zijn tijdens werktijden bereikbaar via telefoonnummer **010 599 049 0**, buiten werktijden kiest u in het keuzemenu voor optie 1 (**spoed**). U wordt dan doorverbonden met de dierenarts van dienst. De spoedlijn is dagelijks tussen **07:30 h** en **23:30 h** bereikbaar. Buiten deze tijden wordt u doorverwezen.



Dierenkliniek Zwarte Zee
Zwarte Zee 30 3144 DE



010 599 049 0



Info@dierenkliniekwartezee.nl



www.dierenkliniekwartezee.nl



/Dierenkliniekwartezee

Openingstijden:

Balie

Ma, Di, Wo, Do, Vr : 09:00 – 19:00

Open spreekuur

Zaterdag : 09:30 – 12:00

Telefonisch spreekuur *

Ma, Di, Do, Vr : 16:30 – 17:00

**U wordt gebeld*

Voor alle informatie en meer: download de MijnDierenartsApp

